

TriMic®

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY A DOBYTEK.

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ

Hrubý protein	7.80 %
Hrubý tuk	4.25 %
Hrubá vláknina	2.00 %
Hrubé popeloviny	37.20 %
Vápník	9.30 %
Sodík	0.15 %

SLOŽENÍ

uhličitan vápenatý, dextróza, ječná moučka, maltodextrin, hrachová moučka, kvasinkové produkty, sušená kultura *Aspergillus oryzae* v ječné moučce, sušené fermentační extrakty *Kluyveromyces marxianus*

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

VITAMÍNY:	3a700 Vitamin E	970 mg/kg
	3a314 Niacin	2000 mg/kg

MIKROORGANIZMY: 4b1711 *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 1.0 x 10¹² CFU/kg

NÁVOD K POUŽITÍ

Preventivně či jako pro-aktivní opatření v rizikových obdobích:

- Okoloporodní období - 14 dní před a 14 dní po otelení: 20 g/kus/den
- Rozdoj a laktace - od 14. dne po otelení: 10 g/kus/den
- Jalovice při odstavu od mléka na rostlinnou KD - 1-2 týdny po odstavu: 5 g/kus/den
- Krávy po otelení - obohacení volného poporodního nápoje: 20 g/kus/den

Akutně: Kdykoliv klesne příjem sušiny/produkce mléka aplikujte či v případech zdravotních komplikací zvířete přidejte 30 g TriMic do drenče a podejte bachorovou sondou.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Mezi používáním sáčků vždy pečlivě uzavřete.

HMOTNOST BALENÍ: 2,5 kg sáčků / 25 kg pytel

Tento dokument obsahuje pouze nutné informace, které musí výrobci ohledně složení produktů uvádět v souladu s legislativou a nařízeními EU. Z důvodů ochrany přesného složení produktu neuvádíme žádné informace nad rámec těchto požadavků. Více se dozvíte u zástupce MTS.