

BlueLite® Transition Pellets

Podpora hydratace, energetické rovnováhy a příjmu krmiva během tranzitního období.

Kombinace elektrolytů BlueLite® a živých kvasinek do jednoho produktu ve formě krmných pelet pro zamíchání do TMR či posypem na žlab. Podpora krav v tom nejvíce náročném období kolem otelení, kdy dochází k výraznému propadu v příjmu krmiva i vody. Chutná forma elektrolytů, vitaminů a energie pro stimulaci příjmu vody dohromady s živými kvasinkami pro nastartování bacheru a vysoký příjem sušiny. Výsledkem je rychlé zotavení se z náročného otelení, což je tou nejlepší cestou pro bezproblémový rozdoj a celou laktaci.

Pokus Agro Záhoří, 2016 - Efekt krmení produktu 2 týdny před a 2 týdny po otelení: Výsledky pokusu zcela jasně prokazují podstatný pozitivní vliv na výši mléčné užitkovosti v průběhu celé laktace (305) - u krav o +271, u prvotetek o +840 kilogramů mléka navíc oproti kontrolní skupině. Zpracovaná finanční analýza potvrdila výrazný ekonomický přínos.



Hlavní funkční složky: Živé kvasinky, pufrované elektrolyty, osmolyty, draslík, hořčík, sodík, chloridy, více zdrojů energie

Vlastnosti a benefity

- Kombinace prověřeného efektu živých kvasinek s elektrolyty Bovine BlueLite® pro tranzitní období.
- Živé kvasinky navozují správné podmínky v bacheru, podporují rozvoj celulolytické mikroflóry a stimulují vyšší příjem krmiva.
- Rychlá a efektivní adaptace na zásadní změny krmné dávky před a po otelení.
- Elektrolyty a osmolyty napomáhají udržovat rovnováhu tekutin a buněčnou integritu.
- Zdroj rychle dostupné energie během období poklesu příjmu sušiny.
- Vyšší produkce mléka a na vrcholu laktace zásadně zvyšuje profitabilitu.


Doporučené podání

- V dávce 125 g/ks/den po dobu 3 týdnů před otelením a 3 týdny po otelení.

Dostupné balení: 20 kg pytel

BLUELITE®
TRANSITION
by TechMix
PELLETS

Průměrný denní nádoj na skupinu - měřeno 14 týdnů od otelení.



BlueLite® Transition Pellets

DOPLŇKOVÉ MINERÁLNÍ KRMIVO PRO DOJENÉ KRÁVY.

ANALYTICKÉ SLOŽENÍ

Hrubý protein	8.80 %	Vápník	3.60 %
Hrubý tuk	3.60 %	Sodík	2.60 %
Hrubá vláknina	9.20 %	Fosfor	0.79 %
Hrubé popeloviny	21.0 %	Hořčík	0.21 %
		Draslík	4.43 %

SLOŽENÍ

pšeničný šrot, sušená řepná dužina, dextróza, třtinová melasa, chlorid sodný, chlorid draselný, laktóza, sorbitol, uhličitan draselný, sacharóza, fosfát monosodný, hydrogenuhličitan sodný, vápníkov soli palmových mastných kyselin, uhličitan vápenatý, dikalcium fosfát, maltodextrin, ječná mouka, hrachová mouka, kvasinkové výrobky, sušená kultura *Aspergillus oryzae* v ječné moučce, sušený extrakt fermentace *Kluyveromyces marxianus*, fruktóza, síran hořečnatý, oxid hořečnatý

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

VITAMÍNY:	3a672a Vitamin A	268 000 UI/kg	3a671 Vitamin D3	52 000 UI/kg
	3a700 Vitamin E	650 mg/kg	3a314 Niacin	160 mg/kg

STOPOVÉ PRVKY:	3b607 chelátová forma zinku, hydrát	325 mg/kg
----------------	-------------------------------------	-----------

MIKROORGANIZMY:	E1711 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077	8 x 10 ¹⁰ CFU/kg
-----------------	--	-----------------------------

NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučená denní dávka je 125 g/ks v období 3 týdnů před a 3 týdnů po otelení.
Zamíchejte do TMR či posypem na žlab.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě při teplotách mezi 4 °C a 30 °C. Po otevření vždy pytel opět pevně uzavřít.

HMOTNOST BALENÍ:

25 kg pytel

Tento dokument obsahuje pouze nutné informace, které musí výrobci ohledně složení produktů uvádět v souladu s legislativou a nařízeními EU. Z důvodů ochrany přesného složení produktu neuvádíme žádné informace nad rámec těchto požadavků. Více se dozvíte u zástupce MTS.